




行政院衛生署桃園醫院
結核病防治教學示範中心

地址：33004 桃園市中山路1492號

網址：<http://www.tygh.gov.tw>

電話：(03)3699721轉2457・2493

FAX：(03)3795129



我是抗結核病藥物

我是抗結核一線藥物



結核傳染靠空氣，
環境通風衛生好。



咳嗽禮貌要做到，
隨地吐痰最糟糕。



咳嗽三週快驗痰，
胸部X光定期照。



規律生活勤服藥，
按時就醫快快好。



Rifater 藥物簡介



商品名：Rifater 簡稱：RFT
藥品外觀：橘紅色圓形錠

藥物劑量

一般劑量(體重50公斤以上者)，
每天5顆，一次服用。
※特殊情況，請依醫師指示服用。

注意事項

1. 藥品可能使尿液呈橘紅色，請不要擔心。
2. 請依照醫師指示，不可隨意停藥。

藥物可能之副作用

肝炎、腹部症候、過敏、血液學變化、周圍神經炎、高尿酸血症。

Rifinah 藥物簡介



商品名：Rifinah 簡稱：RFN
藥品外觀：橘紅色橢圓形錠劑(300mg)/
桃紅色圓形錠劑(150mg)

藥物劑量

體重50公斤以上者：300mg 每天2顆，一次服用。
體重50公斤以下者：150mg 每天3顆，一次服用。
※特殊情況，請依醫師指示服用。

注意事項

1. 藥品可能使尿液呈橘紅色，請不要擔心。
2. 避免將RFN300與RFN150併用，此用法INH劑量不足。
3. 請依照醫師指示，不可隨意停藥。

藥物可能之副作用

肝炎、腹部症候、過敏、血液學變化、周圍神經炎。

Ethambutol 藥物簡介



商品名：Myambutol 簡稱：EMB
藥品外觀：灰色圓形錠劑

藥物劑量

一般劑量每天2顆，一次服用。
※特殊情況，請依醫師指示服用。

注意事項

1. 若有視力模糊情形請告訴醫師。
2. 請依照醫師指示，不可隨意停藥。

藥物可能之副作用

視神經炎、過敏。

Isoniazid 藥物簡介



商品名：Duracrin tab 簡稱：INH
藥品外觀：白色橢圓形錠劑

● 藥物劑量

一般劑量每天3顆，一次服用。
※特殊情況，請依醫師指示服用。


● 注意事項

1. 避免併服制酸劑(胃藥)，若需併服請至少錯開2小時。
2. 請依照醫師指示，不可隨意停藥。

● 藥物可能之副作用

肝炎、周圍神經炎、過敏。

Rifampicin 藥物簡介



商品名：Rifampicin 簡稱：RIF/RMP
藥品外觀：暗紅色膠囊(300mg)/
藍/暗紅色雙色膠囊(150mg)

● 藥物劑量

體重50公斤以上者：300mg 每天2顆，一次服用。
體重50公斤以下者：150mg 每天3顆，一次服用。
※特殊情況，請依醫師指示服用。

● 注意事項

1. 藥品可能使尿液呈橘紅色，請不要擔心。
2. 請依照醫師指示，不可隨意停藥。

● 藥物可能之副作用

肝炎、腹部症候、過敏、血液學變化。

● Pyrazinamide 藥物簡介



商品名：Pyrazinamide
簡稱：PZA
藥品外觀：白色圓形錠劑

● 藥物劑量

一般劑量每天2-3顆，一次服用。
※特殊情況，請依醫師指示服用。

● 注意事項

請依照醫師指示，不可隨意停藥。

● 藥物可能之副作用

肝炎、高尿酸血症、過敏。



我是抗結核二線藥物

初次治療沒做好，
二線藥物來報到。



治療困難費心力，
吃藥打針免不了。



下定決心勤配合，
耐心治療就會好。



YA我們都恢復健康了



Kanamycin 藥物簡介



注射用藥

商品名：Kanamycin
簡稱：Km
藥品外觀：白色粉末瓶裝

● 藥物劑量

注射針劑，由醫師處方決定。

● 注意事項

1. 腎功能不佳患者，需小心使用。
2. 請依照醫師指示，不可隨意停藥。

● 藥物可能之副作用

聽力、平衡功能損害、腎毒性、過敏、頭暈、耳鳴。

Amikacin藥物簡介



注射用藥

商品名：Sikacin Inj.
簡稱：AMK
藥品外觀：透明液體瓶裝

● 藥物劑量

注射針劑，由醫師處方決定。

● 注意事項

1. 腎功能不佳患者，需小心使用。
2. 請依照醫師指示，不可隨意停藥。

● 藥物可能之副作用

聽力、平衡功能損害、腎毒性、過敏、頭暈、耳鳴。

Streptomycin藥物簡介



注射用藥

商品名：Streptomycin
簡稱：Sm
藥品外觀：白色粉末瓶裝

● 藥物劑量

注射針劑，由醫師處方決定。

● 注意事項

1. 腎功能不佳患者，需小心使用。
2. 請依照醫師指示，不可隨意停藥。

● 藥物可能之副作用

聽力、平衡功能損害、腎毒性、過敏、頭暈、耳鳴。

● Moxifloxacin藥物簡介



商品名：Avelox 簡稱：MOX
藥品外觀：橘紅色橢圓形錠

● 藥物劑量

一般劑量每天1顆，飯前或空腹時服用。
※特殊情況，請依醫師指示服用。

● 注意事項

1. 空腹服用。
2. 不可與制酸劑(Antacids)併用。
3. 請依照醫師指示，不可隨意停藥。

● 藥物可能之副作用

胃腸不適、全身倦怠、過敏性反應、皮膚搔癢、皮膚炎、藥物交互作用。

● Levofloxacin藥物簡介



商品名：Cravit 簡稱：LEV
藥品外觀：粉橘色橢圓形錠

● 藥物劑量

一般劑量每天1.5顆，飯前或空腹服用。
※特殊情況，請依醫師指示服用。

● 注意事項

1. 空腹服用。
2. 不可與制酸劑(Antacids)併用。
3. 請依照醫師指示，不可隨意停藥。

● 藥物可能之副作用

胃腸不適、全身倦怠、過敏性反應、皮膚炎、皮膚搔癢、藥物交互作用。

● Prothionamide藥物簡介



商品名：Prothionamide
簡稱：TBN/PTA
藥品外觀：黃色圓形錠

● 藥物劑量

一般劑量每天2-3顆，可分2-3次服用。
※特殊情況，請依醫師指示服用。

● 注意事項

1. 肝功能不全和糖尿病病人慎用。
2. 請依照醫師指示，不可隨意停藥。

● 藥物可能之副作用

口腔內會有金屬味、胃腸不適、肝炎、噁心、嘔吐、食慾不振。

● Para-AminoSalicylate藥物簡介



商品名：Para-aminosalicylic acid
簡稱：PAS 藥品外觀：土黃色橢圓形錠

● 藥物劑量

一般劑量，每天12-18顆，可分3-4次飯後服用。
※特殊情況，請依醫師指示服用。

● 注意事項

請依照醫師指示，不可隨意停藥。

● 藥物可能之副作用

胃腸不適、肝炎、過敏。

Cycloserine藥物簡介



商品名：Cycloserine
簡稱：Cs
藥品外觀：橘色/紅色雙色膠囊

● 藥物劑量

一般劑量每天2-3顆，一次服用或可分2次服用。
※特殊情況，請依醫師指示服用。

● 注意事項

1. 精神病者不可使用。
2. 本藥可配合高劑量Vit-B6 250mg/天服用。
3. 請依照醫師指示服藥，不可隨意停藥。

● 藥物可能之副作用

精神異常、抽搐、憂鬱症、過敏。

Rifabutin 藥物簡介



商品名：Rifabutin 簡稱：RBT 藥品外觀：深紅色膠囊

● 藥物劑量

一般劑量每天1-2顆，一次服用。
※特殊情況，請依醫師指示服用。

● 注意事項

1. 此藥不建議兒童及孕婦使用。
2. 藥品可能使尿液呈橘紅色，請不要擔心。
3. 請依照醫師指示，不可隨意停藥。

● 藥物可能之副作用

肝炎、血液學變化、腸胃不適、過敏。